

Recomendaciones para pacientes luego de la **broncoscopia**

Luego del procedimiento el paciente no puede comer ni tomar nada por espacio de 1 hora.

Luego de este lapso de tiempo, el paciente puede tomar una aromática, jugo o té. Si con la ingesta de esta bebida presenta tos o ganas de vomitar, suspende la ingesta por un lapso de 30 minutos y luego intenta nuevamente con la bebida. Si no presenta ninguno de esos síntomas, puede avanzar a ingerir alimentos sólidos como lo hace normalmente.

El paciente puede presentar dolor o “carraspera” en la garganta, esto se debe a la administración de anestesia tópica en las cuerdas vocales y a que el equipo pasó por allí y esta se encuentra un poco resentida. Durante el día se irá pasando la molestia.

Si el paciente presenta malestar general, escalofríos y fiebre puede ser manejado con tratamiento sintomático (Acetaminofén 2 tabletas de 500mg). Si persistiese con los síntomas mencionados, se debe comunicar con nosotros en los horarios de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., al teléfono 322 70 90 EXT: 4187 ó de lo contrario, debe dirigirse a nuestro servicio de urgencias.

Si se le realizaron **biopsias**

Es posible que luego del procedimiento presente expectoración con sangre hasta por 3 días, esto es normal dado a que se tomaron muestras durante el procedimiento. Se debe estar pendiente de que la sangre de la expectoración disminuya y si por el contrario aumenta, debe consultar a nuestro servicio de urgencias.

Si presenta dolor y/o opresión en el pecho, dificultad para respirar, dolor en la espalda que aumenta con el pasar de las horas, sangrado por la boca en gran cantidad debe dirigirse a nuestro servicio de urgencias.

Debido a la administración de fármacos sedantes intravenosos para reducir ansiedad asociada al procedimiento y recuerdo del mismo, el paciente debe estar acompañado por una persona mayor de edad, no puede realizar ninguna actividad que implique responsabilidad en toma de decisiones o que precise atención. Tampoco puede conducir automóvil, motocicleta o bicicleta el día de la realización del procedimiento.