



INHIBIDORES DE LOS SGLT2 (ISGLT2)

Esta terapia hace que elimines el exceso de glucosa por la orina, además tiene un efecto protector cardiovascular y puede ayudar a disminuir el peso.



- Dapaglifozina (XIGDUO o FORXIGA)
- Empaglifozina (JARDIANCE)

Efectos secundarios:

- Infecciones por micosis genital
- Infecciones urinarias
- Es importante tener un estricto aseo genital. Preferiblemente lavar con agua después de cada eliminación y mantener libre de humedad, así disminuyen los riesgos.
- Puede tomarse a cualquier hora del día, pero a la misma hora para evitar olvidos.

CLÍNICA CARDIO **vid**
Congregación Mariana

Clínica Cardio VID Sede Robledo
Cl. 78B N° 75 - 21 • Medellín

Sede ambulatoria Ciudad del Río
Distrito Vera
Carrera 44 #20 - 40 B2 Local 11 • Medellín

Contact center para citas y ayudas diagnósticas
• Teléfono: 604 3221900 • WhatsApp 322 3692943

Información general
• Teléfono: 604 3227090

Vigilado Supersalud



clinicacardiovid

www.cardiovid.org.co

CLÍNICA CARDIO **vid**
Congregación Mariana



¡Hola...hola! Otra vez...
Soy Dimelli, hoy te traigo una información útil porque te hablaré de una de las herramientas más comunes para el tratamiento de la diabetes y es la

Terapia con Medicamentos orales Para Diabetes mellitus tipo 2

Dependiendo del deterioro del páncreas tu médico decidirá cuál es la mejor opción y cuál combinación es la más conveniente, todos los pacientes con Diabetes Tipo 2, tienen dentro de su tratamiento medicamentos orales ya que el problema no es solo falta de insulina sino resistencia a la misma.



HIPOGLUCEMIANTES:

Su función es estimular el páncreas a que produzca insulina.



Glibenclamida:

- Tabletas de 5 mg
- **Dosis Máxima:** 4 tabletas al día
- Tomarla 30 min antes de las comidas principales

Efectos secundarios:

- **Hipoglucemias:** Glucosa en sangre menor de 70, consumir una carga de glucosa simple (1 cucharada de azúcar en ½ vaso de agua, 200 ml de jugo de naranja o de gaseosa normal) e informar a su médico.
- **Ganancia de peso:** Lleva a cabo un plan nutricional y ejercicio.



SENSIBILIZADORES:

Quiere decir: ayuda a que la insulina que aun produces, pueda trabajar mejor y disminuye la liberación de glucosa del hígado.



Metformina:

- Tabletas de 850 mg y 500 mg
- **Dosis Máxima:** 3 tabletas al día (2550 mg)
- Tomar sobre o luego de las comidas principales

Efectos secundarios:

- **Generalmente son gastrointestinales como:** dolor abdominal, falta de apetito, diarrea o gases. No produce hipoglucemia.
- Puede ser combinada con insulina y otros medicamentos para la diabetes.



INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA – 4 (DPP-4)

Es una terapia que ayuda a que el páncreas pueda cumplir con su trabajo de producir insulina.



- Sitagliptina (JANUVIA, JANUMET)
- Linagliptina (TRAYENTA)
- Vildagliptina (GALVUS, GALVUS MET)

- En general son medicamentos seguros incluso en pacientes con enfermedad renal o cardíaca. Tienen efecto neutro en peso (no aumentan de peso) y se pueden combinar con otros medicamentos.
- Puede tomarse a cualquier hora del día, pero a la misma hora para evitar olvidos.