


Cuidados especiales del catéter periférico



¿Qué es un catéter periférico?

Es un tubo delgado y flexible que se inserta en una vena con el fin de administrar medicamentos de forma continua o intermitente según aplique.

¿Cuándo se debe cambiar el catéter?

Por protocolo institucional, el catéter debe cambiarse normalmente cada 6 días. También se debe cambiar en caso de presentar calor, dolor, inflamación, enrojecimiento en el sitio donde está insertado o salida de algún líquido.

¿Qué cuidados y manejo se le deben dar al dispositivo?


- ▶ Desplazarse con acompañante, ya que el catéter podría enredarse y ocasionar una caída.
- ▶ No halar el catéter ni retirárselo por sí solo.
- ▶ No tocar ni mover el catéter.
- ▶ Solicitar que quien lo atienda siempre se higienice las manos.
- ▶ Evitar mojar el catéter; pedir al personal de salud que lo cubra antes de bañarse.
- ▶ Avisar si observa que la película transparente que cubre el catéter se está despegando, para que sea cambiado.
- ▶ Avisar si la línea está en contacto con el suelo.
- ▶ Informar inmediatamente al personal de salud si presenta los signos de alarma mencionados anteriormente.
- ▶ Asegurarse de que el personal de salud realice la limpieza o desinfección del puerto durante 10 a 15 segundos en los siguientes casos:
 - * Administración de medicamentos: la limpieza debe ser antes de la aplicación del medicamento.
 - * Si no se le están administrando medicamentos por el catéter, cada 12 horas se debe verificar con solución salina, en esos casos se aplica la limpieza. puerto cada 12 horas.



¿Qué complicaciones se pueden presentar?

1. Flebitis

Es una de las complicaciones más frecuentes asociadas al uso de catéteres intravasculares periféricos. Consiste en la aparición de inflamación en la pared que recubre los vasos sanguíneos.



Manifestaciones

- Dolor, calor, rubor, tumefacción e induración en la zona.

2. Oclusión del catéter

Es la incapacidad para infundir o aspirar dentro de un catéter intravascular.


Manifestaciones

- Resistencia al administrar medicamentos o soluciones.
- Imposibilidad de irrigar u obtener retorno sanguíneo.
- Fuga o infiltración de fluido desde el sitio de inserción.

- El medicamento no avanza o lo hace más lento de lo esperado.
- Presencia de sangre o medicación viscosa en el equipo.

3. Hematoma

Acumulación de sangre en un tejido debido a la ruptura de un vaso sanguíneo.



Manifestaciones

- Inflamación, coloración violácea y dificultad para administrar la solución.

Preguntas

1. ¿Qué cuidados debe tener un paciente con catéter periférico?
2. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes del catéter periférico?
3. ¿Qué manifestaciones indican una posible flebitis?



Clínica Cardio VID Sede Robledo
Cl. 78B N° 75 - 21 • Medellín

Sede ambulatoria Ciudad del Río
Distrito Vera Carrera 44 #20 - 40 B2 Local 11 • Medellín

Contact center para citas y ayudas diagnósticas
• Teléfono: 604 3221900 • WhatsApp 322 3692943
Información general • Teléfono: 604 3227090

www.cardiovid.org.co

Síguenos @cardiovid

